

Emetrex® Tablets

For nausea, vomiting & vertigo

Composition

Each tablet contains:

Active Ingredients:

Cyclizine Hydrochloride 50 mg
Pyridoxine Hydrochloride 30 mg

Inactive Ingredients: Microcrystalline Cellulose (Avicel PH 102), Lactose Monohydrate D.C, Povidone XL 10, Povidone K25, Maize starch, Purified Talc, Magnesium stearate, Sodium starch glycolate, Patent blue lake E131

Purpose section

Antiemetic

Indications and Uses:

For the prevention and treatment of the nausea, vomiting, or dizziness associated with motion sickness.

Warnings:

Do not exceed recommended dosage.

Ask a doctor or pharmacist before use if you have a breathing problem such as emphysema or chronic bronchitis, glaucoma, difficulty in urination due to enlargement of the prostate gland.

Ask a doctor before use if you are taking sedatives, or tranquilizers.

Do not give this product to children who have a breathing problem such as chronic bronchitis or who have glaucoma, without first consulting the child's doctor.

Do not give to children under 6 years of age.

When using this product you may get drowsy avoid alcoholic drinks, alcohol, sedatives, and tranquilizers as they may increase the drowsiness effect. be careful when driving a motor vehicle or operating machinery.

In case of overdose, get medical help or contact a Poison Control Center right away.

Pyridoxine

Long term use of large doses of pyridoxine is associated with the development of severe peripheral neuropathies; the dose at which these occur is controversial. Pyridoxine reduces the effects of levodopa but this does not occur if a dopa decarboxylase inhibitor is also given. pyridoxine reduces the activity of altretamine. it has also been reported to decrease serum concentrations of phenobarbital and phenytoin. Many drugs may increase the requirements for pyridoxine; such drugs include hydralazine, isoniazide, pencillamine, and oral contraceptives.

This Product contains Lactose, Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, the Lapp lactose deficiency or glucose- galactose malabsorption should not take this medicine

Pregnancy or Breast Feeding Section:

It should be used in pregnancy only if it is clearly needed (pregnancy Category B) and under the supervision of a physician.

Vitamin B6 is excreted into breast milk.

Dosage and Administration:

Directions

Adults and children 12 years of age and over: 1 tablet every 4-6 hours, not to exceed 4 tablets in 24 hours.

Children 6 to 12 years of age: 1/2 tablet every 6-8 hours, not to exceed 1.5 tablets in 24 hours.

Storage Condition:

Store at temperature not exceeding 30°C, In Dry Place.

How Supplied:

Carton Box contains 1, 2 (AL/ Opaque light blue PVC) Strips each of 10 tabs + inner leaflet.

Keep all medicaments out of reach of children



Product of:
AMOUN PHARMACEUTICAL CO.
El-Obour City, Al Qalyubia, Egypt. S.A.E.

إميتركس® أقراص

مضاد للغثيان والقى والدوار

التركيب:

يحتوى كل قرص على:

المواد الفعالة:

سيلكليزين هيدروكلوريد ٥٠ مجم

بيريدوكسين هيدروكلوريد ٣٠ مجم

المواد الغير فعالة: ميكروكريستالين سليلولوز (افيسيل PH 102)،

لاكتوز احادي المائيه دي.سي، بوفيدون XL10، بوفيدون K25، نشا،

تلك منقي، ستيرات المغنيسيوم، نشا الصوديوم جليكولات، لون ازرق.

الغرض الدوائي: مضاد للقيء

دواعى الإستعمال:

للقاية من علاج الغثيان والقيء أو الدوخة المصاحبة لدوار الحركة.

التحذيرات

لا تتجاوز الجرعة الموصي بها

اسأل الطبيب أو الصيدلي قبل الاستخدام إذا كان لديك مشكلة في التنفس مثل انتفاخ الرئة أو التهاب الشعبى المزمن أو ارتفاع ضغط العين و صعوبة في التبول نتيجة تضخم غدة البروستاتا.

اسأل الطبيب قبل الاستخدام إذا كنت تأخذ المنومات، أو المهدئات

لا تعط هذا المنتج للأطفال الذين لديهم مشكلة في التنفس مثل التهاب الشعب الهوائية المزمن أو الذين لديهم ارتفاع ضغط العين. دون استشارة الطبيب أولاً.

لا يستخدم للأطفال تحت ٦ سنوات من العمر

عند استخدام هذا المنتج قد يحدث نعاس، تجنب تناول المشروبات الكحولية أو المهدئات، حيث انها قد تزيد من تأثير النعاس وتوخي الحذر عند قيادة السيارات أو تشغيل الآلات.

في حال الجرعة الزائدة ، يجب الحصول على المساعدة الطبية أو الاتصال بمركز مراقبة السموم على الفور.

قد يصاحب استعمال بيريدوكسين لفترات طويلة بجرعات كبيرة حدوث التهاب شديد في الأعصاب ولكن من غير المعروف الجرعات التي تسبب هذه الحالة.

يقلل بيريدوكسين من تأثير ليفودوبا ولكن هذا لا يحدث اذا تم تناول احد الادويه المشطلة لانزيم دوبا ديكاربوكسيلاز معهم . يقلل بيريدوكسين من نشاط التريتامين. كذلك يقلل بيريدوكسين من تركيز فينوباربيتال و فينتوين. قد تزيد العديد من الأدوية مثل هيدرالازين و ايزونيازيد و بينيسلامين وحبوب منع الحمل التي تعطى عن طريق الفم من الاحتياج للبيريديوكسين.

يحتوى المستحضر على مادة لاکتوز. إذا كان لديك حساسية من بعض السكريات أخبرطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

الحمل أو الرضاعة

يجب ان يستعمل اثناء الحمل فقط إذا كان هناك احتياج واضح (درجة السلامة ب للحوامل) و تحت اشراف الطبيب.

يفرز البيريديوكسين في لبن الأم .

الجرعة

البالغون والأطفال الذين يبلغون ١٢ سنة من العمر وما فوق: قرص كل ٤-٦ ساعات، بعد اقصى ٤ أقراص خلال ٢٤ ساعة.

الأطفال من ٦ إلى ١٢ سنة من العمر: نصف قرص كل ٦-٨ ساعات، بعد اقصى قرص ونصف في خلال ٢٤ ساعة.

ظروف التخزين:

يحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة مئوية وفي مكان جاف

العبوة:

عليه كرتون تحتوي علي ٢٠١ (الومنيوم / ازرق فاتح معتم PVC) شرائط يحتوي كل منها علي ١٠ اقراص + نشره داخلية.

تحفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال



انتاج
٧١١-٤/٤/٢٠٢١
P150167.01
129

شركة أمون للأدوية
مدينة العبور، القليوبية، مصر.