



فلوادجست®

أقراص ملغفة
ممتدة المفعول

ميرابيجرون ٢٥ مجم
ميرابيجرون ٥٠ مجم

ما هي أقراص فلوادجست®؟

للكبار

• أقراص فلوادجست®

عبارة عن دواء يأخذ بوصفة طيبة يمكن استخدامه بمفرده أو مع سوليفيناسين سكينات لعلاج البالغين الذين يعانون من الأعراض التالية بسبب حالة تسمى فرط نشاط المثانة سلس البول المستعصي: حاجة قوية للتبول مع حدوث تسرب أو ترطيب.

- الحاجة الشديدة للتبول على الفور

- التكرار: كثرة التبول

لالأطفال

• أقراص فلوادجست®

هو دواء يستعمل بوصفة طيبة لعلاج الأطفال الذين تبلغ أعمارهم ٣ سنوات وما فوق والذين لا يقل وزنهم عن (٣٥ كجم) ، مع حالة تسمى فرط النشاط العصبي للمثانة.

من غير المعروف ما إذا كان علاج فلوادجست® هو علاج آمن وفعال للأطفال الذين يعانون من فرط النشاط العصبي للمثانة لكنهم أقل من ٣ سنوات من العمر.

من الذي لا يجب أن يأخذ أقراص فلوادجست®؟

لا تتناول أقراص فلوادجست® إذا كنت تعاني من حساسية تجاه ميرابيجرون أو أي من مكونات أقراص فلوادجست®، راجع نهاية نشرة معلومات المريض للحصول على قائمة كاملة بالملحوظات في أقراص فلوادجست®.

قبل تناول أقراص فلوادجست®، أخبر طبيبك عن جميع حالاتك الطبية، بما في ذلك إذا كنت:

• تعاني من مشاكل في الكبد.

• تعاني من مشاكل في الكلى.

• تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم غير المنضبط.

• صعوبة في إفراط مثانتك أو ضعف تدفق البول.

• حامل أو خططين للحمل.

من غير المعروف ما إذا كانت أقراص فلوادجست ستؤدي الجنين

تحديث إلى طبيبك إذا كنت:

حاملًا أو تخططين للحمل

• ترضعن طفلك أو تخططين للرضاع.

من غير المعروف ما إذا كانت أقراص فلوادجست تنتقل إلى لبن الرضاعة الخاص بك.

تحديث إلى طبيبك حول أفضل طريقة لإرضاع طفلك إذا كنت تتناولين أقراص فلوادجست®. أخبر طبيبك عن جميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية التي تصرف دون وصفة طيبة والفيتامينات والمكملات الغذائية.

قد تؤثر أقراص فلوادجست على طريقة عمل الأدوية الأخرى، وقد تؤثر الأدوية الأخرى على طريقة عمل فلوادجست®.

طراحية: عمان

أخبر طبيبك بشكل خاص إذا كنت تتناول:

• ثيوريزازين (ميلازيل أو ميلازيل إس)

• هليكينيد (تاموبوكور)

• بروباپينون (ريشمول)

• الديجووكسين (انوكسين)

• سوليفيناسين سكينات

كيفية تناول أقراص فلوادجست®؟

تناول أقراص فلوادجست® تمامًا كما يوصي طبيبك بتناولها.

• يجب أن تأخذ فرضاً واحداً من فلوادجست® مرة واحدة يومياً.

• إذا وصف طبيبك أقراص فلوادجست® و سوليفيناسين سكينات معاً، يجب أن تأخذ ١ قرص فلوادجست® و ١ قرص سوليفيناسين سكينات في نفس الوقت مرة واحدة في اليوم.

• يجب تناول أقراص فلوادجست مع الماء وابتلاع القرص بالكامل.

• لا تضع أو تكسر أو سحق القرص.

• يمكن للبالغين تناول أقراص فلوادجست مع الطعام أو بدونه.

• يمكن للبالغين تناول أقراص فلوادجست و سوليفيناسين سكينات سوية مع الطعام أو بدونه

• يجب على الأطفال تناول أقراص فلوادجست مع الطعام

• إذا فاتتك جرعة من أقراص فلوادجست، تناولها في أسرع وقت ممكن.

إذا مضى أكثر من ١٢ ساعة منذ تناول آخر جرعة من أقراص فلوادجست، فتجاوز هذه الجرعة وتتناول الجرعة التالية في الوقت المعتاد.

• إذا تناولت الكثير من أقراص فلوادجست®، فاتصل بطبيبك أو اذهب إلى أقرب غرفة طوارئ في المستشفى على الفور.

ما هي الآثار الجانبية المحتملة لفلوادجست®؟

فلوادجست® قد تسبب آثاراً جانبية خطيرة، بما في ذلك:

ضغط الدم المرتفع.

قد يتسبب فلوادجست في ارتفاع ضغط الدم أو جعله أسوأ.

إذا كان لديك تاريخ من ارتفاع ضغط الدم، أنت وطبيبك يجب فحص ضغط دمك أثناء تناول

فلوادجست®.

اتصل بطبيبك إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

عدم القدرة على إفراغ المثانة (احتباس البول).
من الممكن أن يؤدي فلوادجست® إلى زيادة فرص عدم قدرتك على إفراغ مثانتك إذا كان لديك انسداد في مخرج المثانة أو إذا كنت تعاني من اشتغال أدوية أخرى لعلاج فرط نشاط المثانة. أخبر طبيبك على الفور إذا كنت غير قادر على إفراغ المثانة.

فلوادجست® قد يسبب رد فعل تحسسي مع انتفاخ الشفتين أو اللسان أو الحلق مع أو بدون صعوبة في التنفس. توقف عن استخدام فلوادجست® وتوجه فوراً إلى أقرب غرفة طوارئ في المستشفى.

البالغون الصابون بفرط نشاط المثانة
تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً لأقراص فلوادجست® ما يلي:
إرتفاع ضغط الدم
ألم أو انتفاخ في الأنف أو الحنجرة (الإنهاك بلعوم أنفي).
التهاب المسالك البولية
صداع

تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً لأقراص فلوادجست®، عند استخدامها مع سوليفيناسين سكينات، ما يلي:

* فم جاف
* التهاب المسالك البولية
* امساك

سرعة ضربات القلب
الأطفال الذين يعانون من فرط النشاط العصبي
تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً لفلوادجست® ما يلي:
التهاب المسالك البولية
ألم أو انتفاخ في الأنف أو الحنجرة (الإنهاك بلعوم أنفي).

إمساك
صداع

أخبر طبيبك إذا كان لديك أي عرض جانبي يزعجك، ولا يزول، أو إذا كان لديك تورم في الوجه، والشفتين.

لسان أو حلق، قشريرية ، طفح جلدي أو حكة أثناء تناول فلوادجست®.
هذه ليست كل الآثار الجانبية المحتملة لفلوادجست®.

للمرزيد من المعلومات، أسأل طبيبك أو الصيدلي.

استدعى الطبيب للحصول على المشورة الطبية حول الآثار الجانبية.

تفاعل الأدوية
اطلب من الطبيب الإبلاغ عن استخدامهم لأنّي وصفة طيبة أو مكملات غذائية بسبب تعاطي هذا مع فلوادجست® قد يتطلب تمديد الجرعة / أو زيادة مرافق هذه الأدوية.

كيف يمكن تخزين أقراص فلوادجست®؟

احفظ بهدا الدواء بعيداً عن الأطفال
لا تستخدم هذا الدواء بعد تارikh انتهاء الصلاحية المكتوب على الكرتونة.

• يحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة مئوية في مكان جاف.

الصالحة: عمان

هذا الدواء لا يتطلب أي طريق للتخلص

معلومات عامة حول الاستخدام الآمن والفعال لأقراص فلوادجست®.

توصى الأدوية أحياناً لآغراض أخرى غير تلك المذكورة في نشرة معلومات المريض.

لا تستخدم أقراص فلوادجست® لحالة غير موصوفة لها.

لا تعطي فلوادجست® أقراصاً لأشخاص آخرين، حتى لو كانت لديهم نفس الأعراض التي لديك. قد يضرهم.

تخفض هذه النشرة أهم المعلومات حول فلوادجست® أقراص.

إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات، ابحث مع طبيبك.

يمكنك أن تطلب من طبيبك أو الصيدلي الحصول على معلومات حول فلوادجست® أقراص.

ما هي مكونات أقراص فلوادجست®؟

المادة الفعالة: ميرابيجرون ٢٥ مجم

المادة الفعالة: ميرابيجرون ٥٠ مجم

المواد غير الفعالة لفلوادجست® ٢٥ مجم: بولي إيثيلين إكسيد(بولي اوكيسي ١١٥٠)، بيوتيتيهد هيدرووكسي تولوين، فوسفات الكالسيوم ثانوي الهيدروجين اللامائي، تلك منقى، مغليسوم ستيرات، اوبيادي بن،

الماء غير الفعالة لفلوادجست® ٥٠ مجم: بولي إيثيلين إكسيد(بولي اوكيسي ١١٥٠)، بيوتيتيهد هيدرووكسي تولوين، فوسفات الكالسيوم ثانوي الهيدروجين اللامائي، تلك منقى، مغليسوم ستيرات، اوبيادي بن، ماء منقى، ايثل الكحول، العبوة.

تركيز ٢٥ مجم: عليه كرتون تحتوي على ٣ (الومنيوم / شفاف بي في بي في دي

سي) شرائط في غلاف الومنيوم كل شريط يحتوي على ١٠ أقراص ملغفة ممتدة المفعول + نشره داخليه.

تركيز ٥٠ مجم: عليه كرتون تحتوي على ٣ (الومنيوم / شفاف بي في بي في دي

سي) ملغف في غلاف الومنيوم وكل شريط يحتوي على ١٠ أقراص.

تحفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال

V03-29/6/2022
P150045.00
242

شركة آمون للأدوية ش.م.م
مدينة العبور، القليوبية، مصر.