

Antodine®

Famotidine + Antacids
Dual Action

Chewable Tablets

Composition:

- Each chewable tablet contains famotidine 10 mg, calcium carbonate 667 mg, magnesium hydroxide 200 mg.

Properties:

- Antodine® chewable tablet combines antacids with an acid reducer in single chewable tablet. This formula has dual action, it provides complete and fast relief of heartburn and dyspepsia that starts controlling acid in seconds and delivers long lasting relief for 12 hours.

Therapeutic indications:

- The short-term symptomatic relief of heartburn, indigestion, acid indigestion, and hyperacidity.

Contraindication:

- In patients allergic to famotidine or other H2 blockers, or from calcium or magnesium containing antacids.

- Moderate or severe renal failure.

- Severe hepatic impairment.

Adverse Effects:

- Cardiovascular arrhythmia, AV block palpitation prolonged QT interval, in patients with impaired renal function, has been reported very rarely.

- Musculoskeletal rhabdomyolysis musculoskeletal pain including muscle Cramps, arthralgia.

- The drug is well tolerated by most patients. Yet it may rarely cause diarrhea, dizziness, headache, rash, liver enzyme abnormalities, hepatitis constipation or vomiting.

Pregnancy & Lactation:

- This product should not be used during pregnancy unless the potential benefit of treatment to the mother outweighs the possible risks to the developing fetus.

- Famotidine is excreted in human milk and magnesium salts may enter breast milk and cause diarrhea in infants; a risk to newborns / infants cannot be excluded. A decision must be made whether to discontinue breast-feeding or to discontinue / abstain from therapy with famotidine / antacid combination taking into account the benefit of breast-feeding for the infant and the benefit of therapy for the mother.

Dosage:

- Adults and children 16 years of age or older: One tablet to be chewed for the relief of symptoms. No more than two tablets to be taken in 24 hours.

How supplied:

- Strips of 10 tablets in packs of 1 strip.

Keep all medicaments out of reach of children



Product of:

AMOUN PHARMACEUTICAL CO.

SAE

El-Obour City, Cairo, Egypt.

أنتودين®

فاموتيدين + مضادات للحموضة
تأثير مضاعف

أقراص للمضغ

التركيب:

- يحتوى كل قرص للمضغ على ١٠ مجم فاموتيدين، ٦٦٧ مجم كربونات الكالسيوم، ٢٠٠ مجم هيدروكسيد الماغنسيوم.

الخواص:

- تتميز أقراص أنتودين® للمضغ بإحتوائها على تركيبة من مضادات للحموضة والتي تعمل على تقليل الحموضة بالمعدة، بالإضافة إلى مادة الفاموتيدين التى تقلل من إفراز الحمض بالمعدة، لذلك فإن هذه التركيبة لها تأثيراً مزدوجاً من حيث سرعة إزالة الشعور بالحموضة وعسر الهضم وأيضاً إمتداد المفعول لمدة ١٢ ساعة.

دواعى الإستعمال:

- تخفيف الأعراض علي المدى القصير من حرقان المعدة، وعسر الهضم، وعسر الهضم الحمضي، وفرط الحموضة.

موانع الاستعمال:

- لا يستخدم أنتودين® مع المرضى الذين لديهم حساسية مفرطة من أحد المواد الفعالة أو من أى المواد الأخرى من نفس المجموعة.

- قصور فى وظائف الكلى المتوسط والشديد.

- القصور الشديد فى وظائف الكبد.

الأعراض الجانبية:

- الجهاز الدورى: تغير فى ضربات القلب وزيادة فترة QT فى القلب فى المرضى الذين يعانون من أختلال فى وظائف الكلى وهى نادرة الحدوث.

- الجهاز العضلى الهيكلى: انحلال الرايبيدات، آلام بالعضلات، شد عضلى، إلتهاب بالمفاصل.

- أنتودين® ليست له أعراض جانبية، ولكن قد يحدث فى حالات نادرة بعض الإسهال، الصداع، الدوخة، الإمساك، القيء، فقدان للشهية، طفح جلدى، تغيرات فى إنزيمات الكبد أو إلتهاب الكبد.

الحمل والرضاعة:

- لا يستخدم هذا الدواء اثناء فترة الحمل او الرضاعة.

الجرعة:

- البالغين والأطفال من سن ١٦ سنة واكبر ٢-١ قرص يومياً.

العبوة:

- شريط يحتوى على ١٠ أقراص فى عبوة من ١ شريط.

تحفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال



V07-2/1/2019

شركة أمون للأدوية

P150085.05

66

مدينة العبور، القاهرة، مصر.

