

My-Sweet Baby N Syrup

Summary Of product Characteristic (SmpC)
(This information is intended for use of health professionals)

1 NAME OF THE MEDICINAL PRODUCT

My-Sweet Baby N

2 PHARMACEUTICAL FORM

Syrup

3 QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION

Each 5 ml contains:

Dill Oil (Anethum Graveolens, D Carvone By GLC 43%-63%) 2.3mg.

Caraway oil(Carum Carvi fruit, Ketone as Carvone by GLC 50%-65%) 0.0183 mg

4 CLINICAL PARTICULARS

4.1 Therapeutic indications

A. For the symptomatic relief of digestive disorders such as bloating, flatulence, and digestive spasms.

B. Help stimulate appetite.

4.2 Posology and method of administration

A-Route of administration:

For oral use

Adults and the elderly: not applicable

B-Recommended Frequency:

Infants & Children

< 6 months: 2.5 ml 2-3 times daily (to be used under medical supervision)

6– 12 months: 5ml 3 times daily

>1year: 10ml 3 times daily

>4 years: 15 ml 3 times daily

C- Duration of use:

As directed by the physician

4.3 Contraindications :

Hypersensitivity to the active substances or apiaceae (umbelliferae) Family or to any of the excipients

Listed in section 5.1

Should not be used where impaired kidney function

4.4 Special warnings and precautions for use

This Product contains Sucrose, Patients with rare hereditary problems of fructose intolerance, glucose-galactose malabsorption or sucrase isomaltase insufficiency shouldn't take this medicine

The use in patients with liver disease, cholangitis,

achlorhydia, gallstones and any other biliary disorders is not recommended.

If symptoms Worsen during use of medicinal product a doctor or pharmacist should be asked .

If symptoms Persist, Medical advice should be sought.

Keep all medicines out of the reach of children.

To be used under medical supervision .

4.5 Interaction with other medicinal products and other forms of interaction

None known

4.6 Fertility, Pregnancy and lactation

Not applicable.

4.7 Effects on ability to drive and use machines

Not applicable.

4.8 Undesirable effects

None known.

4.9 Overdose

None known.

5 PHARMACEUTICAL PARTICULARS

5.1 List of excipients

Tribasic sodium citrate dihydrate, Citric acid monohydrate, Sucrose, Kolliphore RH 40, Methyl Paraben Sodium, Propyl Paraben sodium, Orange liquid flavor, Purified Water

5.2 Shelf life

3 years

5.3 Storage Conditions

Store at temperature not exceeding 30°C.

5.4 Nature and contents of container

Carton Box containing amber PET plastic bottle containing 125 ml syrup with white PP Plastic cap with inner LDPE plastic foam liner with red LDPE Plastic ring And transparent polypropylene measuring Cup + inner leaflet

5.5 Special precautions for disposal & other handling

None.

6 Marketing authorization Holder & Contact

Amoun Pharmaceutical company

Website: www.amoun.com

7 Marketing authorization no

104H/2022

8 Date of revision of the text: 21/06/2023

Keep all medicaments out of reach of children



Product of:

AMOUN PHARMACEUTICAL CO.

S.A.E.

El-Obour City, Al Qalyubia, Egypt.

أو الصيدلي .

-تحفظ جميع الادوية بعيداً عن متناول الاطفال.

-يستخدم تحت اشراف طبي.

-تناول ادوية أخرى:

لا شيء معروف

-الحمل والرضاعة:

لا ينطبق هذا الدواء مخصص للأطفال

-القيادة واستخدام الآلات:

لا ينطبق

٣- كيفية تناول ماي- سويت بيبي إن شراب :-

- الرضع والأطفال

أقل من ٦ شهور: ٢.٥ مللى ٢-٣ مرات يومياً (يستخدم تحت إشراف طبي)

من ٦ إلى ١٢ شهراً: ٥ مللى ٣ مرات يومياً

< سنة: ١٠ مللى ٣ مرات يومياً

< ٤ سنوات: ١٥ مللى ٣ مرات يومياً

إذا كنت تتناول جرعة أكبر من ماي- سويت بيبي إن شراب عما هو موصى به:

استشر الطبيب أو الصيدلي

-إذا نسيبت تناول ماي- سويت بيبي إن شراب:

استشر الطبيب أو الصيدلي

-إذا توقفت عن تناول ماي- سويت بيبي إن شراب:

استشر الطبيب أو الصيدلي

٤-أثار جانبية محتملة

لا شيء معروف.

٥-التخزين:

يحفظ بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. مدة الصلاحية: ٣ سنوات

ظروف التخزين: يحفظ في درجة حراره لا تزيد عن ٣٠ درجة مئوية

٦-مزيد من المعلومات:

-مواد السواغ: سبترات الصوديوم ثنائي المائيه ثلاثي القاعدة، حمض الستريك احادي المائيه، سكر، كوليفور RH40، ميثل بارابين صوديوم، بروبيل بارابين صوديوم، نكهه البرتقال، ماء مقطر

-العوبة: عليه كرتون تحتوي علي زجاجه بلاستيك تحتوي علي ١٢٥ مللي شراب بغطاء بولي بروبيلين بلاستيك بفوم داخلي بلاستيك بولي ايثيلين منخفض الكثافه و حلقه حمراء بلاستيك بولي ايثيلين منخفض الكثافه مع كوب قياس

شفاف من البولي بروبيلين + نشره داخليه

الشركة المصنعة وصاحبة ترخيص التسويق: شركه امون للأدويه

العنوان مدينة العبور، القليوبيه مصر

التليفون: (+ ٢٠٢) ٤٦١٤٠١٠٠ (١٠ خطوط)

الفاكس: ٤٦١ ٠٣٥٠٠

البريد الالكتروني: www.amoun.com

تم مراجعة محتوى هذه النشرة في: ٢١/٦/٢٠٢٢

تحفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال

V07-26/6/2023

P150204.05

226

إنتاج شركة أمون للأدوية

مدينة العبور، القليوبية، مصر.



ماى-سويت بيبي إن شراب

نشرة معلومات للمستخدم

١-الاسم التجاري للدواء العشبي:

ماي- سويت بيبي إن شراب

٢-بيان التركيب:

يحتوي كل ٥ مللي علي:

زيت الشبث ٢,٣ مجم (د كارفون ٤٢ %ـ ٦٣ %)

زيت الكراوية ٠,١٨٣ مجم (كيتون بصوره كارفون ٥٠ %ـ ٦٥ %)

اقرأ بإمعان كامل النشرة قبل تناول الدواء لأنها تحتوي على معلومات تهمك.

قد يكون هذا الدواء متاحاً بدون وصفة طبية ولكن لاتزال تحتاج ان تتناول ماي- سويت بيبي إن شراب بحرص لتحصل على افضل النتائج .

*احتفظ بالنشرة. قد تحتاج لقراءتها ثانية.

* إذا كنت بحاجة لمزيد من المعلومات اسأل طبيبك أو الصيدلي.

*إذا تفاقمتم لديك الاعراض أو اذا لم تتحسن بعد ٧-١٤ يوماً يجب عليك أن تتصل بالطبيب.

*إذا تفاقم أي من الآثار الجانبية، أو إذا كنت تلاحظ آثار جانبية لم تذكر في هذه النشرة، الرجاء بلغ طبيبك أو الصيدلي.

محتوى النشرة:

١-ما هو ماي- سويت بيبي إن شراب وما هي إستعمالاته.

٢-قبل تناول ماي- سويت بيبي إن شراب

٣- كيفية تناول ماي- سويت بيبي إن شراب .

٤-أثار جانبية محتملة.

٥-كيفية التخزين.

٦- معلومات إضافية .

١-ما هو ماي- سويت بيبي إن شراب وما هي إستعمالاته.

- للتخفيف من أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الامتلاء وانتفاخ البطن والتقلصات الهضمية.

- يساعد على تنشيط الشهية.

٢-قبل تناول ماي- سويت بيبي إن شراب

لا تتناول ماي- سويت بيبي إن شراب:

- فرط الحساسية للمواد الفعالة وعائلة الفصيلة أو أي من السواغات المدرجة في قسم ٦

-لا ينبغي أن تستخدم في حالة خلل في وظائف الكلى

إحذربصورة خاصة عند تناول ماي- سويت بيبي إن شراب:-

- يحتوي هذا المنتج على السكروز، ولا يجب على المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة من عدم تحمل الفركتوز أو سوء امتصاص الجلوكوز والجالاكتوز أو قصور إيزومالتاز السكراز عدم تناول هذا الدواء.

-لا ينصح باستخدامه في المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد والتهاب الأقنية الصفراوية فقد حمض المعدة (اللاكورديه) وحصى المرارة وأي اضطرابات صفراوية أخرى.

-إذا تفاقمتم الأعراض أثناء استخدام المنتج الطبي ، يجب استشارة الطبيب