Levoxin Film coated tablets

levofloxacin 250 mg, 500 mg

In these mentioned relations, Levenila Scrimitators exp. Secure, and the second security of the second second security of the second security of the second security of the second second security of the second second

Indication		Daily dose regimen	Duration Of treatmen	
		(according to severity)		
Acute bacterial sinusitis		500 mg once daily	10 -14 days	
Acute bacterial exacerbations of chronic bronchitis		500 mg once daily	7 - 10 days	
Community-acquired pneumonia		500 mg once or twice daily	7 - 14 days	
Pyelonephnitis		500 mg once daily	7-10 days	
Uncomplicated cystitis		250 mg once daily	3 dins	
Complicated urinary tract infections		500 mg once daily	7 - 14 days	
Chronic bacterial prostatitis		500 me once daily	28 days	
Complicated Skin and soft tissue infections		500mg once or twice daily	7 - 14 days	
Inhalation Anthras		500 mg once daily	8 weeks	
Special populations				
impaired renal function (cn	ratinine clearance sc50 ml / min).			
		Dose regimen		
	250 mg / 24 h	500 mg / 24 h	500 mg /12 h	
Creatinine dearance	first dose: 250 mg	first dase: 500 mg	first dose: 500 mg	

becompanion or continue growths in two whose 4.5 In columns of these patients will be evaluate that the default only be sittled on the allower of alternative tradered device, assess and allowers, and heart has a regular and the sitted of the alternative tradered device, and the sitted of the sit

Finish should be about a sole amounted model affection in said or also deproyees, now most of fourth pipilations, or development or endours of the adobterns or Medical Researchers (Medical Researchers (Medical Researchers)). The research of the state o

should be abland to contact their dates immediately prior to continuing freezeness or more resource resource resource.

Changianum.

Ch

concommentary formation with an oral broughcomic agent ing. Chloracturische or with hould in the base dashels polents, careful monitoring of blood gloone is Distributional administrational properties of the control of the properties of the control of the contr

in reactions have been reported in patients receiving quisedones, including teroffuxain. In very rare cases these have progressed to suicidal thoughts and induspring lobations—sometimes after only a single done of levoldusatin (see section 4.0), in the event that the patient divertops these reactions, lecofluxating the description of appropriate measures instituted. Catalism is recommended if the obseluctaris in the water in pyrother; patients or in patients with history the discontinual many progressions assures in similarity catalism or incommended in the obseluctaris in the water in pyrother; patients or in patients with history that the discontinual many progressions are also assured to the contract of th

Exisional annumentals:
Casas of unsure or summerimeter polynomopopulty resulting in paraesthesia, hypacolhesia, dyscolhesia, or weakens have been reported in patients receiving flamospanisheses Princips under traditional list for the dark of the absolute in latent that is common flamospanisheses Princips under traditional list for the dark of the absolute of patients of common growthese of common flamospanisheses of the patients of the absolute of patients of common flamospanishes of the patients of the absolute of patients of percent flamospanishes of the absolute of patients of percent flamospanishes of the absolute of patients of percent flamospanishes of the absolute of patients of percentage of the absolute of patients of the absolute of patients of percentage of the absolute of patients of the absolute of the absolute of the absolute of patients of the absolute of patients of the absolute of the absolute of patients of the absolute of patients of the absolute of the

Search of the colors and the colors of the c

Historia to Kome

The badd for of colorpories an increased by 35% when condensistent with leverdanacis.
Hamist Komatica Consistent of the Consistent of th

Programs, Description of the foundation of the foundation in programs records the absence of human data and due to the experienced risk of damage. Because and the contract of We consider the treat decision means. There is southern derivation or the receive of a decisional in these mells become right become ri

een Below is based on data from clinical studies in more than 8360 patients and on extensive post marketing experience.

The described according to the MedDRA system organ class below. Frequencies are defined using the following conventions: very common (a 1/10), uncommon (a 1/100), a report of the available data).

System organ Class	Common (≥1/100 to <1/10)	Uncommon (±1/1,000 to <1/100)	Rare (±1/10,000 to <1/1,000)	Not known (cannot be estimated from available data)
infections and infestations		Fungal infection including Candida infection Pathogen resistance		
Blood and Lymphatic system disorder		Leukopenia Eosinophilia	Thrombocytopenia Neutropenia	Pancytopenia Haemolytic Anaemia, Agranulocytosis
immune system disorders			Angioedema Hypersensitivity (see section 4.4)	Anaphylactic Ashock Anaphylactoid A shock (see section 4.4)
Metabolism and nutrition disorders		Anorexia	Hypoglycaemia particularly in diabetic patients (see section 4.4)	Hyperglycaemia Hypoglycaemic coma (see section 4.4)
Psychiatric Disorders*	Insemnia	Arodely Confusional state Nervousness	Psycholic reactions (with e.g. hallacination, parancial Depression Agitation Abnormal dreams Nightmares	Psychotic disorders with self-endangering behaviour including suicidal ideation or suicide attempt (see section 4.4) Mental health problems
Nervous system Disorders*	Headache Duziness	Somnolence Teernor Dysgeusia	Parandhesia Consulsion (see sections 4.5 and 4.4)	Peripheral sensory neuropathy (see section 4.4) Peripheral sensory motor neuropathy (see section 4.8) Parosmai neuropathy (see section 4.8) Dyskinosia Extrapyramidal disceder Agussia Syncope Benign intracranial hypertension
tye disorders*			Visual disturbances such	Transient vision loss
Ear and Labyrinth disorders*		Vertigo	as blurned vision (see section 4.4) Tinnitus	(see section 4.4) Hearing loss Hearing impaired
Cardiac Disordors**			Tachycardia, Palpitation	Wentricular tachycardia, which may rosult in cardiac arrest Venicular arrhythmia and tornade de pointes (reported predominantly in patients with risk factors of Q1 prolongation), olic trocardiogram QT prolonged (see sections 4.4 and 4.9)
lascular Disorders**		_	Hypotension	
Respiratory, thoracic and		Dyspnoea		Bronchospasm Postemonitis alfonsis
mediastinal disceders Gastro-intestinal disorders	Diarrhona Vomišng Nausea	Abdominal pain Dyspepsia Flatulence Convipation		Pneumoritis allergic Panceattis Diarrhoea – haemorrhagic which in very rare cases may be indicative of embrocolitis, including pseudomembranous colit (see section 4.4)
Hepatobiliary disorders	Hepatic ercyme increased (ALT/AST, alkaline phosphatase, CGT)	Blood bilirubin increased		Jaundice and severe liver injury, including cases with fatal acute liver failure, primarily in patients with severe underlying diseases (see section 4.4) Honalitis
Sein and subcutaneous issue disorders b		Rash Pruitus Urticaria Hyperhidrosis		Tosic epidermal necrolysis Slevens-Johnson syndrome Erytherna multiforme Photosensilivity reaction (see section 4.4) Leukocytochavic vasculitis Stomalitis
Musculeskeletal and connective issue disenders*		Arthralgia Myalgia	fenden disearders (see sections 4.3 and 4.4) including tendinitis (e.g. Achilles tendon) Aluscular weakness which may be of special importance in patients with myanthenia gravits (see section 4.4.)	Stomatilis Rhabdamyolysis Rhabdamyolysis Tendon rupture (e.g. Achilles tendon) (see sections 4.3 and 4.4) Ligament rupture Autsele rupture Arthritis
Renal and Urinary disorders		Blood creatinine increased	Renal failure acute (e.g. due to interstitial nephritis)	
General disorders and administration site conditions*		Asthenia	(e.g. due to intensitial nephrito) Pyrexia	Pain (including pain in back, chest, and extremities)

to constitution of the con

Claim-politic pomounts

Linguishing promounts

Chemical Constitution of the Constitution of t

Keep all medicaments out of reach of children



Amoun Pharmaceutical Co. El-Obour City, Al Qalyubia, Egypt. S.A.E.

ليشوفلوكساسين 250مجم و500مجم

إصابتانية بشرورية لمصامات القدار الرفاع مصام القداب). عما قبال ليضامة بقد من المهم المدورة الأميرة أو من مسام القلب الطلقي، أو تسلح الأمير أو مواط العقط الأمري أو أن استطرابات السبح العلم مثل منذرية ما وإمان أو منذارية إطرز دائلوس أو منذارية فريزاً أو منذارية شوفين (التهاب أمراض المطرابات الدعوة على الفيانية الشراوي تكافيس والقياب الشراوي المسائلة، ومرض عيدس وإنشاع مشتلة الديرة أن وهدر والتهاب التشارية ولتي الدينة إلى المشتلة الدينة التي المشتلة الدينة أن

ية لجموعة الكينولون، بما بهّذ ذلك **ليشوكسين.** ارتفاع أو انخفاض شديد بهّ مستويات الجلوكوز بهّ الدم، إذا براقبة مستويات الجلوكوز بهّ الدم **ب**غناية .

من الموقوع للقامل (العاب أو يقرق إلا الأوان رزاد معاطرات لا كت من مرضى كيار السن (فول 40 مانًا) ، أو خصت من المؤوض من الموقوع القامل المؤوض ا

ست مراجع خاصة من المدور يصد مصدر مورودي من الحرق الرواقية المركز المواقعة المركز المواقعة المركز المركز المركز أو المسابقية الكلام المركز المواقعة المركز ا

نج "إيجابية كاذبة" لمسكنات الألم القوية المسماة الأفيون" في الأشخاص الذين يتناولون أهراص **ليشوكسين** المللفة. [ذا بـ بإجراء اختبار تلبول، هأخبرهم أنك تتناول أهراص **فيشوكسون** المللفة

اء نثائج أسلبية كاذبة البعض الاختيارات المستخدمة في المختبر للبحث عن البكتيريا المسببة لمرض السل.

القلاف: أوبادري وردي الشركه المستمدة و صاحبه الترخيص: شركه امون للأدويه تاريخ مراجعة النشرة من قبل هيئة الدواء المصرية: يوليو 2023

- لا تأخذ هذه الأدوية بإذ نفس الوقت مع **ليشوكسون** خذ جرعتك قبل ساعتين على الأقل من أقراس **ليشوكسين** أو بعد ك**ه** تأخذ

ي من ال<mark>يشوكسين (بليدون</mark>كساسين) 250 مجم المثلثة مرد أو مرتين كل يوم واحد من أقراص <mark>ليشوكسين</mark> (ليثوفتوكساسين) 250 مجم مقلقة مرد أو مرتين كل يوم للك المولية بها بيا ولانك الكلي أو الثقافة فرضين من اليشوكسين اليشوفاكسياسين) 250 مجم أقراص مقلقة مرد كل يوم واحد من اليشوكسين (ليشوفاكسياسين) 250 مجم أقراص مقلقة مرد كل يوم

در احد می کیسورستانا ت مه آخریرستانا می و احد می گیرگی شده این از این افزار اماری اماری

على عاجل. - إسلام المراقبة للتوريخ المراقبة على المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة المراقبة على وجوه مشكلة خادة - المراقبة على المراقبة - المراقبة المراقبة المراقبة الوشوق فية الأولية أو الأوليقة، يتأثر وتر الموقوب فية أغلب الأخيان وية بعض المالات، يمكن أن يتكسر

سي عد تسمن تسيد المهدات. بصرك ضعيفًا أو إذا كان لديك أي اضطرابات أخرى في العين أثناء تناول أقراص ليقوظوكساسين المغلقة، فاستشر أخصائي العيون

شار چدار آف تنظیر آخی حتی امن بری کال (Composition) می اطلاح برای است تا این متنا به است کال استان الدور بید و استان برود برای در استان الدور استان الدور استان الدور استان الدور بید از استان الدور بین بیستی الارستان الدست فیر معرفی الارستان الدور الدور استان الدور الدور الدور الدور الدور الدور الدور الارستان الدور الارستان الداملیة دستان الشهد و استان الدور الدور

تحفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال ابتاج ابتاج مون للأدوية V12-10/7/2023 شركة آمون للأدوية P150186.01 مدينة العبور، القليوبية، مصر.

