

Haemostop®
Film Coated Tablets
Ethamsylate 250mg

Antihemorrhagic

1. DRUG NAME
HAEMOSTOP® 250 mg. Film Coated Tablets

2. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION
Ethamsylate 250mg

For the full list of excipients, see section 6.1.

3. PHARMACEUTICAL FORM
Film Coated tablet
White round biconvex film coated tablet.

4. CLINICAL INDICATIONS

4.1. Therapeutic indications
Medicine for the treatment of:
• bleeding by capillary fragility,
• Menorrhagia without detectable organic cause,
And in general or specialized surgery (O.R.I, ophthalmology, gynecology) for:
Reducing blood loss during surgical procedures, especially patients on anticoagulants

4.2. Dosage and method of administration

Dosage

Adults:
• In continuous treatment: 6 tablets per day in 3 doses, 10 to 20 days per month.
• Pre-operative: 6 tablets per day for 3 days.
• Post-operative: 6 tablets per day.

Paediatric population

• Same treatment regimen as adults, by reducing the dosage by half, i.e. 3 tablets per day in 3 doses.

4.3. Contraindications
This medicine SHOULD NOT be used in case of hypersensitivity to ethamsylate and/or any of the other ingredients.

4.4. Special warnings and precautions for use

• Several cases of isolated fever which reappeared when treatment was resumed have been reported with ethamsylate. If fever develops, treatment should be stopped and should not be resumed.

In the absence of information on the safety of ethamsylate in patients with acute prophyxia, this drug is not recommended in these patients.

• If Haemostop tablets are administered to reduce severe and/or prolonged menorrhagia and no improvement is observed, possible pathological causes should be investigated and excluded.

The product contains lactose. Patients with rare hereditary problems of galactose intolerance, the Lapp lactose deficiency or glucose-galactose malabsorption should not take this medicine.

4.5. Interactions with other drugs and other forms of interaction
The data available to date do not suggest the existence of clinically significant interactions.

Interactions with paraclinical examinations:
Taking ethamsylate in therapeutic doses can distort the enzymatic creatinine assay by giving lower values.

During treatment with ethamsylate, the sample collection (e.g. blood test) required for laboratory testing should be done prior to the first daily administration of the drug to minimize any potential interactions of ethamsylate with laboratory tests.

4.6. Fertility, Pregnancy and Breastfeeding

Pregnancy:
Data from the use of ethamsylate in pregnant women are limited. Animal studies have not shown any direct or indirect harmful effects with respect to reproductive toxicity. As a precautionary measure, it is preferable to avoid best to the use of ethamsylate during pregnancy.

Breastfeeding:

From the use of ethamsylate in pregnant women are limited. Animal studies have not shown any direct or indirect harmful effects with respect to reproductive toxicity. As a precautionary measure, it is preferable to avoid best to the use of ethamsylate during pregnancy.

Keep all medicaments out of reach of children

Product of:
AMOUN PHARMACEUTICAL CO.
S.A.E.
El-Obour City, Al Qalyubia, Egypt.

لا ينصح بالرضاعة الطبيعية خلال فترة العلاج.
هيموستوب® و الرياضيين.
لا يوجد

قيادة السيارات واستخدام الآلات

3. كيفية تناول هيموستوب®
احرص دائمًا على تناول هذا الدواء تمامًا كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي. استشر طبيبك أو الصيدلي، إذا كان لديك شك.

الجرعة:
البالغين: فرسن 3 مرات في اليوم.

الجرعة المقترنة للأطفال:
الأطفال: فرسن 3 مرات في اليوم.

طريقة تناول الدواء:
عن طريق الفم.

إذا كنت تأخذ **هيموستوب®** أكثر مما يجب:
لا يوجد

إذا كنت تأخذ **هيموستوب®** أقل مما يجب:
لا يوجد

إذا كنت تتناول **هيموستوب®**:
لا يوجد

إذا كنت تتناول **هيموستوب®** لا يوجد

4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟
مثل جميع الأدوية، يمكن أن يُسبب تأثيرًا جانبية، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.
• التعب والإرهاق، والغثيان، والقيء، والإسهال.

• نفخة جدي من المثيرو / أو بقع على الجلد،
• صداع

• انخفاض حاد في عدد خلايا الدم البيضاء (ندرة المحببات)

• انخفاض حاد في عدد خلايا الدم البيضاء (قلة العدوى)

• دودغ للقيمة، تراجع من مفعوك أو انخفاض شديد في ضغط الدم و / أو اصوات خطورة (سمدة الحساسية تالية) مع التورم و / أو بقع على الجلد إلى درجة أكثر انخفاض (شدة التحسس).
• انتفاخ عن الآثار الجانبية

استشر الطبيب المعالج أو الصيدلي إذا شعرت بأثر جانبية حتى تلك التي لم يرد ذكرها في هذه النشرة الدوائية ويمكنك أيضًا الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرةً من خلال مركز pv.followup@edaegypt.gov.eg

5. Overdose
To date, no cases of overdose have been reported. In the case of an overdose, treatment will be symptomatic.

5. PHARMACOLOGICAL PROPERTIES

5.1. Pharmacodynamic properties
Pharmacotherapeutic class: OTHER SYSTEMIC HEMOSTATIC.

Pharmacodynamic effects
Improvement of platelet adhesiveness and restoration of capillary resistance.

5.2. Pharmacokinetic properties
In humans:

Oral: Ethamsylate is slowly absorbed. After taking 500 mg, the peak plasma concentration is obtained after 4 hours. It is 15 µg/ml. The plasma elimination half-life is approximately 8 hours. The plasma protein-binding rate is high: it is around 95%. Ethamsylate is eliminated mainly through urine, in unchanged (> 80%).

6. PHARMACEUTICAL DATA

6.1. List of excipients
Lactose Monohydrate, Povidone K30, Crospovidone XL, Methyl Cellulose 15 cps, Silicified Microcrystalline cellulose (Prosolve 90), Talc purified, Magnesium stearate.

Film Coat: Opadry white (polyvinyl alcohol, titanium dioxide E171, polyethylene glycol/ macrogol, talc)

6.2. Incompatibilities
Not applicable

6.3. Shelf life
3 years

6.4. Storage precautions
Store at temperature not exceeding 30 °C, in dry place

6.5. Nature and content of the outer packaging
Carton box contains 12 AL/ Opaque PVC/PVDC strips, each of 10 film coated tablets and inner leaflet.

تحفظ جميع الأدوية بعيداً عن متناول الأطفال

٢٠١٤-٦/٢/٢٢

انتاج شركة آمون للأدوية

٣٦٧

٢٥٠ مجم

إيتاميسيلات

هيموستوب®

أقراص

مقدمة

اقرأ هذه النشرة بدقة حيث أنها تحتوي على معلومات تفصيلية.
يجب عليك دائمًا تناول هذا الدواء باتباع المعلومات الواردة في هذه النشرة بدقة أو من قبل طبيبك أو الصيدلي.

* احتفظ بالنشرة الدوائية قد تحتاج أن تقرأها مرة أخرى في وقت لاحق.

* وجّه إلى الصيدلي للحصول على كافة المعلومات المتعلقة بهذا العقار، أو للحصول على نصائح بخصوص تناوله.

* تستقر طبيبك العامل في إنظر ورقته فقط.

* في هذه النشرة الدوائية (انظر ورقته فقط).

* كُم بالتحذير مع طبيبك في حال كنت لا تشعر بأي تحسن في حال شعرت سوء أو توعدت خفيف.

* لا ينصح بتناول هذا الدواء في متناول أيدي الأطفال.

* ما هي محتويات هذه النشرة الدوائية؟

* ما هو هيموستوب®؟ دواعي استخدامه؟

* ما المعلومات التي تبني عرفيتها قبل تناول هيموستوب®؟

* كيفية تناول هيموستوب®؟

* ما الآثار الجانبية المحتملة؟

* كيفية حفظ هيموستوب®؟

* محتويات العبوة ومعلومات أخرى

* ما هو هيموستوب®؟ دواعي استخدامه؟

* أدوية وقف الترتيب المجهزة الأخرى.

* هذا الدواء هو مصاد للتربيط وأقى للأدوية الدموية.

* و يستخدم في ما يلي:

* في علاج الترتيب عن طريق سبب ضعف الأوعية الدموية الصغيرة والترتيب النسائي.

* في حالة إجراء عملية جراحية للحد من فقدان الدم.

* ما المعلومات التي تبني عرفيتها قبل تناول هيموستوب®؟

* لا تأخذ هيموستوب® إذا:

* إذا كنت تعاني من حساسية (فرط الحساسية) للمادة الفعالة (إيتاميسيلات) أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء، والتي يتم سردها في النسخة ٦.

* التحذيرات والاحتياطات:

* إذا كنت تعاني من الحمى أو رد فعل حرجي، إذا توقيع عن تناول هذا الدواء واستشر طبيبك على الفور.

* هذا الدواء لا ينصح بتناوله بشكل عام في حالة الإصابة بأمراض الدم التي تؤثر على الهموموجلوبين (الزورقيريد الحادة).

* اختبارات الدم: أخبر طبيبك إذا كنت تتناول هيموستوب® وتحتاج إلى إجراء اختبار دم لأن هذا الدواء قد يتسبّب في انخفاض تأثير الكرياتينين في الدم عن المعدل الطبيعي.

* يرجى إدخال طبيبك أو الصيدلي إذا كنت ستصنع أي حضوات طبية، أثناء العلاج باستخدام إيتاميسيلات، يجب مع العينات (مثل سعوب الدم) المطلوبة لإجراء الاختبارات العملية قبل تناول الدواء الأول وبعده لتقليل أي تفاعل محتمل للإيتاميسيلات مع الاختبارات العملية.

* يرجى هذا المستحضر على الملاكتوز المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة من عدم تحمل الجلاكتوز أو تقصّ الداء لاكتوز أو سوء امتصاص الجلاكتوز والجالاكتوز يرجى الإدخال هنا.

* يرجى هذه العلاج أكثر فعالية إذا ابتعت توصيات تهدى الحياة التالية.

* تحذّن التعرض لأذمة الشميس والحرارة والتوقف لفترات طويلة وأذون الزائد.

* المشي وربما زراعة جوارب مناسبة، هذا يعزز الدورة الدموية.

* هيموستوب® دواعي أخرى.

* أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول مؤخرًا وقد تتناول دويبة أخرى.

* هيموستوب® مع الطعام والشراب

* لا يوجد

* الحمل والرضاعة

* البيانات حول استخدام إيتاميسيلات في النساء الحوامل محدودة. كإجراء وقائي، يفضل تحذّن استخدام هيموستوب® أثناء الحمل.

* إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تقدّمين أنت حامل أو تحظينين للحمل، اسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول هذا الدواء.